

* 抗インフルエンザウイルス薬一覧 *

作用機序	ノイラミニダーゼ阻害作用				キャップ依存性 エンドヌクレアーゼ阻害作用	ノイラミニダーゼ阻害作用
商品名	タミフル		リレンザ	イナビル吸入粉末剤	ゾフルーザ錠	ラピアクタ点滴静注液
	カプセル	ドライシロップ				
一般名	オセルタミビルリン酸塩		ザナビル水和物	ラニナミビルオクタン酸 エステル水和物	パロキサビル マルボキシル	ペラミビル水和物
発売開始年月日	2001年2月	2002年4月	2001年2月	2010年10月	2018年3月	2010年1月
効能効果	A型またはB型インフルエンザ感染症					
投与方法	内服		吸入	吸入	内服	点滴
回数	1日2回		1日2回	1回のみ	1回のみ	1回
期間	5日間		5日間	単回	単回	単回
1回量	【成人・体重37.5kg以上の小児】 75mg	【成人】 75mg 【小児】 幼小児：体重1kgあたり、2mg 新生児・乳児（生後～1歳未満） ：体重1kgあたり、3mg	【成人・小児】 1回10mg（2プリストアー）	【成人・10歳以上の小児】 40mg（2個） 【10歳未満の小児】 20mg（1個）	【成人・12歳以上の小児】 40mg（20mg×2錠） ※ただし、体重80kg以上の場合、 80mg（20mg×4錠） 【12歳未満の小児】 体重40kg以上：40mg（20mg×2錠） 20～40kg未満：20mg（20mg×1錠） 10～20kg未満：10mg（10mg×1錠）	【成人】 300mg（1袋60ml）を点滴 ※合併症等により重症化するお それのある患者には、1日1回6 00mgを点滴。症状に応じて連日 反復投与可能。 【小児】 体重1kgあたり、10mgを点滴 ※上限1回600mg
予防投与	○	○	○	○	×	×